

Patient Education

COVID-19 Vaccine (mRNA)

You must carefully read the "Consumer Information Use and Disclaimer" below in order to understand and correctly use this information

发音

(KO vid nine teen vak SEEN m R N A)

品牌名称：美国

Comirnaty; Moderna COVID-19 Vac (Booster); Moderna COVID-19 Vaccine; Pfizer COVID-19 Vac-TriS 5-11y; Pfizer-BioNT COVID-19 Vac-TriS; Pfizer-BioNTech COVID-19 Vacc; Spikevax COVID-19 Vaccine

品牌名称：加拿大

Comirnaty; Spikevax

此药有何用途？

- 此药用于预防 COVID-19。

我的孩子服用此药前我需要告诉医生些什么？

- 如果您的孩子对此药、此药的任何成分（包括聚乙二醇）或任何其他药物、食品或物质（包括聚山梨醇酯）过敏。请将您孩子的过敏情况及体征告知医生。
- 如果您的孩子感染了 COVID-19，并出现任何可能由 COVID-19 引起的症状，或者如果您的孩子正在等待 COVID-19 检测结果，或近期感染了 COVID-19。
- 如果您的孩子出现伴有发热的疾病。
- 如果您的孩子曾出现某些心脏问题（心肌炎，心包炎）。
- 如果您的孩子曾经有过称为多系统炎症综合征（MIS）的健康问题。
- 若您的小孩出现出血性疾病。
- 如果您的孩子正在服用阿司匹林或血液稀释剂。

- 如果您的孩子接种过不同的 COVID-19 疫苗。
- 如果您的孩子在过去 14 天内接触过 COVID-19 感染者。
- 这不是可与本药物发生相互作用的所有药物或健康问题列表。
- 将您孩子的所有用药（处方药或非处方药、天然产品、维生素）及健康问题告知医生和药剂师。您必须确认，在您孩子当前的身体状况下，与您孩子的所有其他药物同服此药是安全的。在未向医生确认的情况下，请勿开始、停止或改变您孩子服用的任何药物的剂量。

我的孩子服用此药期间我需要知道些什么或做些什么？

- 告诉您孩子的所有健康护理人员您孩子正在服用此药。这包括您孩子的医生、护士、药剂师和牙医。
- 该疫苗不能导致感染 COVID-19。
- 您的孩子需要接种 2 剂此疫苗。为了获得最佳预防效果，两剂都必须注射。有些人群可能还需接种第三剂。有些人群可能还需要接种加强剂次。请确保您知道何时再次带您的孩子去接种剂次。如果您的孩子在注射第一剂后出现严重反应，请咨询医生。
- 目前尚不清楚接种此疫苗的人将在多长时间内免受 COVID-19 感染。
- 像所有疫苗一样，此疫苗可能无法保护所有注射过疫苗的人。如果您有疑问，请咨询医生。
- 如果您的孩子在注射一剂后有副作用，对乙酰氨基酚或非甾体类抗炎药 (NSAID)，如布洛芬或萘普生可能会有所帮助。
- 在注射第二剂后，副作用可能会更频繁地发生。如果您对第二剂有疑问，请咨询医生。
- 接种疫苗后，请让您的孩子按照当地公共卫生官员的建议继续采取防止 COVID-19 传播的措施。这些措施包括常洗手、戴口罩、与他人保持至少 1.8 米（6 英尺）的距离以及避免聚集。
- 如果您孩子的免疫系统功能低下或您正在使用抑制免疫系统的药物，请咨询医生。此疫苗效果可能并不好。
- 在进行干细胞移植或嵌合抗原受体 [CAR]-T 治疗之前或期间接种过这种疫苗的人可能需要再接种一剂疫苗。如果您的孩子曾接受或正在接受其中一种治疗，请咨询医生。

- **如果您的孩子注射了皮下填充剂**，请咨询医生。罕见情况下，在注射此疫苗后，曾发生填充部位或附近肿胀（通常在面部或嘴唇）。这种情况发生时，不会持续很长时间，并会通过治疗而消失。
- **罕见的情况下**，在研究中出现过贝尔氏麻痹病例。尚不确定此疫苗是否是病因。如果您的孩子曾经患过贝尔氏麻痹，请告诉医生。如果您孩子的脸部一侧有肌肉虚弱或下垂等状况，请立即联系医生。
- **不是所有药品**均可用于儿童。请咨询医生。
- **如果您小孩已怀孕或正哺乳：**
- **如果您小孩已怀孕、变为怀孕或正哺乳**，请告知医生。您需要咨询您孩子和婴儿使用本药的受益和风险。

发生哪些副作用时我需要立即打电话给我孩子的医生？

- **警告/注意：**尽管罕见，但一些人在服用此药时可有非常严重甚至是致命的副作用。如果您小孩有任何以下可能与非常严重的副作用相关的体征或症状，请立即告诉您小孩的医生或获取医疗帮助：
- **过敏反应体征**，例如：出疹；荨麻疹；发痒；皮肤发红、肿胀、起泡或脱皮，伴或未伴发热；哮喘；胸部或咽喉紧迫感；呼吸、吞咽或言语困难；异常声嘶；或口部、面部、嘴唇、舌或咽喉肿胀。
- **心动过速或过缓、呼吸急促、头晕、昏厥、虚弱、焦虑、意识混乱或视力或听力发生变化**。这些可能是过敏反应或其他类型反应的其他症状。
- **触觉或感觉减弱。**
- **麻木或刺痛。**
- **mRNA COVID-19 疫苗很少导致某些心脏问题**。症状大多在接种第二剂次后的 7 天内开始出现。这些心脏问题在 COVID-19 患者中的发生率高于接种此疫苗的人群。如果您的孩子出现胸痛、呼吸急促，或您的孩子感觉自己心跳加快、心脏颤动或剧烈跳动，请立即联系医生。如果您对此信息有问题或疑虑，请咨询医生。

此药有哪些其他副作用？

- 所有药物都可导致副作用。然而，很多人没有副作用或仅有轻微副作用。如果这些副作用或任何其他副作用影响您小孩或不能消失，请致电您小孩的医生或获取医疗帮助：
- 注射部位疼痛、发红或肿胀；头痛、肌肉或关节疼痛；发热 38°C (100.4°F) 或更高；寒战；恶心、呕吐、饥饿感减轻或腹泻；腺体肿大或触痛；或者疲倦或不适。大多数副作用为轻微到中度。这些症状大多发生在注射后 3 天内，并在 1 至 3 天内消失。
- 在第一次注射后几天至几周内，注射部位会发生疼痛、发红或肿胀。如果发生这种情况，请咨询医生。让您的孩子在另一只手臂上注射第二剂。
- 这些并非是所有可能发生的副作用。如果有您对副作用有疑问，请致电您孩子的医生。致电您孩子的医生了解有关副作用的医疗建议。
- 您可将副作用报告给您的国家卫生部门。

此药的最佳服用方式是？

- 请您按照孩子医生的医嘱给予此药。仔细阅读向您提供的所有信息。严格遵循所有说明。
- 此药用于肌肉注射。
- 在您的孩子服用此药时或服药后一段时间内对其进行密切观察。请咨询您孩子的医生。

如果我的孩子漏服一剂，我该怎么办？

- 联系医生询问该怎么做。为了获得最佳的 COVID-19 预防效果，请勿让您的孩子遗漏或跳过剂次。

如何储存和/或处置此药？

- 将在医疗机构中为孩子注射。您不能将其存放于家中。

一般药物事实

- 如果您小孩的症状或健康问题未好转或变得更严重，请致电您小孩的医生。
- 请不要拿您小孩的药给其他小孩吃，也不要拿其他小孩的药给您的小孩吃。
- 将所有药品放在安全的地方。将所有药物放在儿童及宠物接触不到的地方。
- 丢弃未使用或过期的药物。除非遵照嘱咐，否则请勿冲入马桶或倒入排水管。如果您对扔掉药物的最好方式有疑问，请咨询药剂师。您所在的地区可能有药物回收计划。

- **一些药物可能有另一份病人须知。**如果您对本药有任何问题，请咨询您孩子的医生、护士、药剂师或其他医务人员。
- **如果您认为使用过量了，请致电当地毒物控制中心或立即进行医疗。**准备好告知或出示服用了什么、服用多少及何时服用。

消费者信息使用及免责声明: 这些概括性信息是诊断、治疗和/或药物信息的不全面概要。这些信息并不全面，应作为帮助用户了解和/或评估潜在诊断和治疗方案的工具。其中未包含所有可能适用于特定患者的病情、治疗、药物、副作用或风险的信息。本信息并非旨在作为医疗建议或替代医护人员根据其对患者特定和独特情况的检查和评估而提供的医疗建议、诊断或治疗。患者必须与医护人员进行沟通，以获得有关其健康、医疗问题和治疗选择的完整信息，包括与使用药物有关的任何风险或获益。本信息不保证任何治疗或药物的安全性、有效性，也不保证任何治疗或药物已获批用于治疗任何特定患者。UpToDate, Inc. 及其附属公司对本信息或其使用不作任何担保或承担任何责任。本信息的使用受使用条款的约束。如需查看使用条款，请访问 <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>。

Last Updated 6/8/22



© 2022 UpToDate, Inc. and its affiliates and/or licensors. All rights reserved.