

# Patient Education

---

## COVID-19 Vaccine (mRNA)

You must carefully read the "Consumer Information Use and Disclaimer" below in order to understand and correctly use this information

### 發音

(KO vid nine teen vak SEEN m R N A)

### 品牌名稱美國

Comirnaty; Moderna COVID-19 Vac (Booster); Moderna COVID-19 Vaccine; Pfizer COVID-19 Vac-TriS 5-11y; Pfizer-BioNT COVID-19 Vac-TriS; Pfizer-BioNTech COVID-19 Vacc; Spikevax COVID-19 Vaccine

### 品牌名稱加拿大

Comirnaty; Spikevax

### 此藥物用於什麼目的？

- 此藥用於預防 COVID-19。

### 我服用此藥物「前」需告知醫師什麼？

- 若您對此藥物，此藥物的任何部分（包括聚乙二醇），或任何其他藥物、食品或物質（包括聚山梨醇酯）過敏。請務必告知您的醫師過敏情形及您出現過的癥狀。
- 如果您罹患 COVID-19、出現任何可能是 COVID-19 的症狀，或者您正在等待 COVID-19 採檢結果，或者您最近曾罹患 COVID-19。
- 若您感到不適且有發熱。
- 若您曾經有過某些心臟問題（心肌炎、心包炎）。
- 如果你曾發生稱為多系統發炎症候群 (MIS) 的健康問題。
- 若您有出血問題。
- 如果您正在服用阿斯匹靈或薄血藥。
- 如果您已接種不同的 COVID-19 疫苗。
- 如果您在過去 14 天內曾接觸 COVID-19 病患。

- 這並不是一份會與此藥物交互影響的所有藥物或健康問題之清單。
- 告知您的醫師與藥劑師有關您的所有用藥（處方藥或非處方藥、天然滋補品、維他命劑）與健康問題。務必確認在您的用藥與健康問題下服用此藥是安全的。諮詢您的醫師前，請勿開始服藥、停藥或改變用藥劑量。

### 在我服用此藥物時，我必須知道或做些什麼？

- **對於使用此藥的所有病患：**
- 告知所有醫療照護提供者您正在服用此藥。這包括您的醫師、護理師、藥劑師和牙醫師。
- 此疫苗不會導致 COVID-19。
- 您需要接種 2 劑此疫苗。必須使用兩劑才能達到最大防護。有些人也可能需要第三劑。有些人也許可以施打追加劑量。確保您知道接受劑量注射的時間。若您在第一劑後出現嚴重反應，請告知您的醫師。
- 目前尚不清楚接種此疫苗的人將在多長時間內免受 COVID-19 的侵害。
- 如同所有疫苗，此疫苗可能無法完全保護所有接種者。若您有任何疑問，請洽詢醫師。
- 若您在注射後有副作用，乙醯胺苯酚或非類固醇抗發炎藥（NSAID）（如布洛芬或萘普生）可能會有所幫助。
- 第二劑後，副作用可能會發生得更頻繁。若您尚有關於第二劑的任何疑問，請洽詢醫師。
- 接種疫苗後，需按照當地公共衛生官員的指示繼續採取行動預防 COVID-19 的傳播。包括經常洗手、戴口罩、與他人保持至少 6 英尺的距離以及避免人群聚集。
- 如果您免疫力低下或正接受會使免疫力低下的藥物，請告知您的醫師。這種疫苗可能沒有作用。
- 在幹細胞移植手術或嵌合抗原受體 [CAR]-T 治療之前或期間接種過此種疫苗的人，可能需要接種另一種疫苗。若您最近曾接受或正在接受其中一種治療，請告知您的醫師。
- 若您已經注射了皮下填充劑，請洽詢您的醫師。接種此疫苗後，很少發生填充劑或其周圍（通常是臉部或嘴唇）腫脹的情況。當這種情況發生時，並不會持續很長時間，且不需治療就會消失。
- 研究中很少有貝爾氏麻痺的病例發生。目前尚未清楚此疫苗是否為原因。告訴醫師您是否曾經患有貝爾氏麻痺。如果您的臉部有一側肌肉無力或下垂的跡象，請立即致電醫師。
- 若您已懷孕、計畫懷孕或進行母乳餵養，請告知醫師。您需與醫師商討使用此藥可能給您和嬰兒帶來的益處與風險。
- **孩童：**

- 某些藥品不適合為兒童病患使用。請洽詢醫師相關事項。

#### 出現哪些副作用時，需要立即致電聯絡我的醫師？

- **警告/小心：** 即便極為罕見，有些人服用藥物時可能會有極為嚴重或甚至致死的副作用。若您出現下列可能與極嚴重副作用相關的任何徵兆或症狀，請立即告知您的醫師或接受醫療協助：
  - 過敏反應的症狀有皮疹；蕁麻疹；發癢；皮膚發紅、腫脹、起泡或脫皮，而且有可能伴隨發燒；喘鳴；胸口或喉嚨緊繃；難以呼吸、吞嚥或說話困難；嗓音異常嘶啞；或嘴巴、臉部、嘴唇、舌頭或喉嚨腫脹。
  - 心跳過快或過緩、呼吸急促、頭暈、昏厥、虛弱、焦慮、意識混亂、視力或聽力改變。這些可能是一種過敏反應的其他症狀或其他類型的反應。
  - 觸覺或感覺水平降低。
  - 麻木或刺痛感。
  - 使用 mRNA COVID-19 疫苗很少發生一些心臟問題。大多數情況下，症狀在第二次給藥後的 7 天內開始。與接種本疫苗的人相比，接種 COVID-19 疫苗的人發生這些心臟問題的機率更高。若您有胸痛、呼吸短促，或者心跳加快、顫動或劇烈跳動，請立即致電醫師。若您對此資訊有任何疑問，請洽詢醫師。

#### 此藥物的一些其他副作用為何？

- 所有藥物皆可能引起副作用。但有許多人沒有副作用，或是只有輕微的副作用。假如任何一項副作用或其他任何副作用令您困擾或是不會消退，請致電您的醫師或接受醫療協助。
- 注射部位疼痛、發紅或腫脹；頭痛；肌肉或關節疼痛；發燒 100.4°F (38°C) 或以上；發冷；胃部不適、嘔吐，感覺不太飢餓或腹瀉；腺體腫脹或疼痛；或感到疲倦或不適。大多數副作用均為輕度至中度。大多數情況下，這些副作用發生在注射後 3 日內，並在 1 至 3 日內消失。
- 第一次注射後的幾天到幾週，注射部位出現疼痛、發紅或腫脹。若發生此情形，請諮詢您的醫師。在另一隻手臂上注射第二劑。
- 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。若您對副作用有疑問，請聯絡您的醫師。請聯絡您的醫師取得關於副作用的醫療意見。
- 您可以向您的國內健康機構通報您的副作用。
- 瀏覽 <https://vaers.hhs.gov/reportevent.html> 或致電 1-800-822-7967 向 FDA/CDC 疫苗不良事件通報系統 (VAERS) 報告副作用。還有一個名為 V-Safe 的智慧型手機工具，可用於檢查您

的狀況和報告副作用。可以在 <https://vsafe.cdc.gov> 找到。如果您需要 V-safe 的協助，請致電 1-800-232-4636。

### 此藥物的最佳服用方法為何？

- 請遵照醫師指示用藥。請詳閱所有的相關資訊。請嚴格遵照所有指示。
- 此藥用於肌肉注射。
- 使用此藥期間和用藥後一段時間，將對您密切觀察。請洽詢您的醫師。

### 若我錯過服藥怎麼辦？

- 請致電您的醫師詢問指示。請勿錯過或略過劑量，以達到對抗 COVID-19 的最大防護。

### 我應如何儲存和/或丟棄此藥物？

- 該針劑需要您前往醫療衛生機構接受注射。您不能將其存放於家中。

### 藥物概述

- 若您的症狀或健康問題未獲改善或變得更糟，請聯絡您的醫師。
- 勿將您的藥物分給其他人吃，也不要吃其他人的藥。
- 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。
- 扔掉未使用或過期的藥物。除非您被告知這樣做，否則不要將藥物沖到廁所中或倒入排水溝中。若您對於如何以最佳方式扔掉藥物有疑問，請向您的藥劑師諮詢。您所在地區可能有藥物回收計劃。
- 某些藥品可能擁有其他病患資訊說明書。若您對此藥有任何疑慮，請聯絡您的醫師、護理師、藥劑師或其他醫療保健提供者。
- 若您認為出現用藥過量的狀況，請致電您的毒物控制中心或立即接受醫療照護。請準備好告知或顯示服用藥物、服用量及發生時刻。

消費者資訊之使用與免責聲明: 此概要資訊是診斷、治療和/或藥物資訊的有限摘要。它並不全面，應用作幫助使用者瞭解和/或評估潛在的診斷和治療方法的工具。它不包括所有關於可能適用於特定病患的病情、治療、藥物、副作用或風險的資訊。它不可用作醫療建議，亦不得用於替代保健服務提供者根據保健服務提供者對病患的特定和獨特情況進行檢查和評估的醫療建議、診斷或治療。病患必須洽詢保健服務提供者，以取得有關他們的健康、醫療問題和治療方法的完整資訊，包括使用藥物的任何風險或益處。此資訊並未擔保任何治療或藥物具安全性或功效，或已獲准用於治療特定病患。UpToDate, Inc. 及其附屬公司不承擔任何與此資訊或其使用相關之擔保或責任。此資訊的使用受使用條款所約束，此條款可在以下網址查

閱 <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>。

Last Updated 6/8/22



© 2022 UpToDate, Inc. and its affiliates and/or licensors. All rights reserved.