

Patient Education

COVID-19 Vaccine (Adenovirus Vector)

You must carefully read the "Consumer Information Use and Disclaimer" below in order to understand and correctly use this information

Telaffuz

(KO vid nine teen vak SEEN ad e noh VYE rus vek tor)

Marka İsimleri: ABD

Janssen COVID-19 Vaccine

Marka İsimleri: Kanada

AstraZeneca COVID-19 Vaccine [DSC]; Covishield [DSC]; Janssen COVID-19 Vaccine; Vaxzevria

Bu ilaç ne için kullanılır?

- COVID-19'u önlemede kullanılır.

Bu ilacı almadan ÖNCE doktoruma ne söylemem gerek?

- Bu ilaca, bu ilacın içeriğindeki herhangi bir şeye (polisorbat 80 dahil), başka ilaçlara, yiyeceklere veya maddelere (polietilen glikol dahil) karşı alerjiniz varsa. Alerjinin ne olduğunu ve yaşadığınız belirtileri doktorunuza anlatın.
- COVID-19 hastasıysanız, COVID-19'dan kaynaklanabilecek herhangi bir belirtiyeye sahipseniz, COVID-19 test sonuçlarınızı öğrenmek için bekliyorsanız veya yakın zamanda COVID-19 olduysanız.
- Ateşli bir hastalığınız varsa.
- Eğer kanama problemlerinizi varsa.
- Kan pıhtıları ve düşük kan trombosit düzeyleriyle (trombositopeni sendromlu tromboz veya TTS) ile ilgili bir sağlık problemi yaşadığınız. Buna heparin kaynaklı trombositopeni (HIT) dahildir.
- Daha önce kapiller kaçak sendromu adı verilen bir sağlık problemi yaşadığınız.
- Daha önce multisistem enflamatuar sendrom (MIS) adı verilen bir sağlık problemi yaşadığınız.
- Aspirin veya kan sulandırıcı kullanıyorsanız.
- Farklı bir COVID-19 aşısı yaptırdığınız.

- Son 14 gün içinde COVID-19 olan biriyle temasta bulduysanız.
- Bu, söz konusu ilaçla etkileşim içine giren tüm ilaçların veya sağlık problemlerinin listesi değildir.
- Doktorunuza ve eczacınıza kullandığınız tüm ilaçlar (reçeteli veya reçetesiz, doğal ilaçlar, vitaminler) ve tüm sağlık problemlerinizi hakkında bilgi verin. Tüm diğer ilaçlarınız ve sağlık problemlerinizi göz önüne alındığında bu ilacı almanızın güvenli olduğundan emin olmalısınız. Doktorunuza onaylatmadan herhangi bir ilaç dozuna başlamayın, dozu bırakmayın veya değiştirmeyin.

Bu ilacı alırken bilmem veya yapmam gereken şeyler nelerdir?

- Sizinle ilgilenen sağlık uzmanlarına bu ilacı aldığınızı bildirin. Bu sağlık uzmanlarına doktorlarınız, hemşireleriniz, eczacılarınız ve diş hekimleriniz dahildir.
- Bu aşı, COVID-19'a neden olamaz.
- Bazı ürünler 1 doz olarak verilirken bazılarının 2 doz olarak verilmesi gerekir. Bazı kişiler ayrıca bir takviye dozu da alabilir. Dozlarınızı almak için geri gelip gelemeyeceğinizi ve ne zaman geri geleceğinizi mutlaka öğrenin. Emin değilseniz doktorunuz veya eczacınızla görüşün.
- Bu aşığı yaptıran kişilerin COVID-19'dan ne kadar süre korunacağı bilinmemektedir.
- Tüm aşılar gibi, bu da aşı olan herkesi tam olarak koruyamayabilir. Sorularınız varsa doktorla görüşün.
- Bir dozdan sonra yan etki yaşarsanız, asetaminofen ya da ibuprofen veya naproksen gibi nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar (NSAID'ler) yardımcı olabilir.
- Aşığı olduktan sonra, yerel halk sağlığı yetkililerinin önerdiği şekilde COVID-19'un yayılmasını önleyen talimatları uygulamaya devam edin. Bunlara sık sık el yıkamak, maske takmak, diğer insanlardan en az 1,8 metre (6 fit) uzakta durmak ve kalabalıklardan kaçınmak dahildir.
- Bağışıklık sisteminiz zayıfsa veya bağışıklık sisteminizi zayıflatan ilaçlar alıyorsanız doktorunuzla görüşün. Bu aşı da işe yaramayabilir.
- Bu aşığı bir kök hücre nakli veya kimerik antijen reseptörü [CAR]-T tedavisi öncesinde veya sırasında yaptıran kişilerin başka bir aşı yaptırmaması gerekebilir. Bu tedavilerden birini gördüyseniz veya görüyorsanız doktorunuzla görüşün.
- Yapılan çalışmalarda nadiren Bell felci vakaları meydana gelmiştir. Nedenin bu aşı olup olmadığı bilinmemektedir. Bell felci geçirdiyse doktorunuza bildirin. Yüzünüzün bir tarafında zayıf veya sarkık kaslar varsa derhal doktorunuzu arayın.
- Çok nadir olarak, bu aşığı yaptıran kişilerde Guillain-Barre sendromu adı verilen bir sinir sistemi problemi görülmüştür. Çoğu zaman semptomlar aşıdan 42 gün sonra başlar. En yüksek risk 50-64 yaş arası erkeklerde görülmüştür. Zayıflık, karıncalanma, yürüme güçlüğü, yüz hareketlerini (konuşma, çiğneme veya yutma gibi) yapmada zorluk, çift görme, gözleri hareket ettirememe veya mesane veya bağırsak kontrolü ile ilgili problemlerinizi varsa derhal doktorunuzu arayın.

- Bu ilaç nadiren kapiler kaçak sendromu (CLS) adı verilen şiddetli ve zaman zaman ölümcül bir probleme neden olmuştur. CLS; düşük tansiyon, anormal kalp atışı, göğüs ağrısı veya kalp krizine neden olabilir. Ayrıca akciğer veya solunum problemleri, midede veya bağırsakta kanama veya düşük kan akışı, böbrek problemleri, şişlik veya kafa karışıklığı hissine yol açabilir. Sorularınız varsa doktorla görüşün.
- Gebeyseniz, gebe kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız bunu doktorunuza bildirin. Size ve bebeğinize yönelik faydaları ve riskleri hakkında görüşmeniz gerekecektir.

Hangi yan etkiler görülürse hemen doktorumu aramalıyım?

- **UYARI/DİKKAT:** Nadiren de olsa bazı insanlarda bir ilaç alırken çok şiddetli ve zaman zaman ölümcül yan etkiler görülebilir. Çok şiddetli bir yan etkiyle ilgili olabilecek aşağıdaki belirtilerden veya semptomlardan herhangi biri varsa, hemen doktorunuz ile görüşün veya tıbbi yardım alın:
- Döküntü, kurdeşen, kaşıntı, ciltte kızarıklık, şişkinlik, kabarcık veya soyulma (yüksek ateşle veya ateş olmadan); hırıltılı nefes alma, göğüste veya boğazda sıkışma, nefes alırken, yutkunurken ve konuşurken zorlanma, olağan dışı ses kısıklığı, ağızda, yüzde, dudaklarda, dilde veya boğazda şişkinlik gibi alerjik reaksiyon semptomları.
- Hızlı kalp atışı, baş dönmesi, bayılma, halsizlik, kollarda veya bacaklarda şişme veya ani kilo alımı. Bunlar bir alerjik reaksiyonun veya farklı bir reaksiyonun diğer belirtileri olabilir.
- Normal hissedilmeyen yanma, uyuşukluk veya karıncalanma hissi.
- Kulaklarda çınlama.
- Nadiren bu aşığı olan kişilerde immün trombositopeni (ITP) adı verilen bir tür düşük kan trombosit seviyesi meydana gelmiştir. Genellikle bu durum aşıdan sonraki 42 gün içinde görülmüştür. Daha önce ITP geçirdiyse doktorunuzla konuşun. Nedeni bilinmeyen herhangi bir morarma veya kanama yaşarsanız derhal doktorunuzu arayın.
- Bu aşığı olan kişilerde çok nadiren trombosit düzeyi düşük (bazen kanamalı) kan pıhtıları meydana gelmiştir. Bu, en sık 30 ila 49 yaş arasındaki kadınlarda meydana gelmiştir. Çoğu zaman belirtiler aşıdan 1 ila 2 hafta sonra başlar. Bazı durumlarda bu durum ölümcül olmuştur. Bu kan pıhtıları beyin, mide bölgesi ve bacaklar dahil olmak üzere farklı yerlerde meydana gelmiştir. Aşağıdaki belirtilerden herhangi birine sahipseniz derhal doktorunuzu arayın: Enjeksiyon bölgesinden uzakta morarma veya küçük kan lekeleri, şiddetli baş ağrısı, geçmeyen baş ağrısı, geçmeyen mide ağrısı, bacakta şişme veya ağrı, göğüs ağrısı, nefes darlığı, bulanık görme, nöbetler veya kafa karışıklığı hissetme.

Bu ilacın bazı diğer yan etkileri nelerdir?

- Tüm ilaçlar yan etkilere neden olabilir. Ancak çoğu kişide yan etki görülmemekte veya hafif yan etkiler görülmektedir. Bu yan etkilerden herhangi biri veya herhangi bir başka yan etki sizi rahatsız ederse veya geçmezse, doktorunuzu arayın veya tıbbi yardım alın:
- Enjeksiyonun yapıldığı yerde ağrı, kızarıklık veya şişlik; baş ağrısı; kas veya eklem ağrısı; 38°C (100,4°F) veya daha yüksek ateş; üşüme; mide bulantısı, kusma veya ishal; hassas veya şişmiş

bezler ya da yorgun veya kötü hissetme. Çoğu yan etki hafif olmuştur. Çoğu zaman bunlar enjeksiyondan sonraki 1 ila 2 gün içinde kaybolmuştur.

- Görülebilecek yan etkiler bunlarla sınırlı değildir. Yan etkilerle ilgili sorunuz varsa, sağlık danışmanınızı arayın. Yan etkilere ilişkin doktor tavsiyesi için sağlık danışmanınızı arayın.
- Yan etkileri ulusal sağlık kurumunuza bildirebilirsiniz.
- Yan etkileri <https://vaers.hhs.gov/reportevent.html> adresinden veya 1-800-822-7967 numaralı telefonu arayarak FDA/CDC Aşı Advers Olay Raporlama Sistemine (VAERS) bildirin. Ayrıca, nasıl olduğunuzu kontrol etmek ve yan etkileri bildirmek için kullanılacak V-safe adında bir akıllı telefon aracı bulunur. Bu araç <https://vsafe.cdc.gov> adresinde bulunabilir. V-safe ile ilgili yardıma ihtiyacınız olursa 1-800-232-4636 numaralı telefonu arayın.

Bu ilaç en iyi nasıl alınır?

- Bu ilacı doktorunuzun talimatına uygun şekilde kullanın. Size sunulan tüm bilgileri okuyun. Tüm talimatları sıkı sıkıya takip edin.
- •Bu ilaç iğne olarak kasa yapılır.
- •Bu ilacı alırken ve dozunuzu aldıktan sonra bir süre boyunca yakından izleneceksiniz. Doktorunuzla görüşün.

Bir dozu atlarsam ne yapmalıyım?

- •Talimatlar için doktorunuzu arayın. COVID-19'a karşı en fazla koruma için dozları kaçırmamanız veya atlamamanız önemlidir.

Bu ilacı nasıl saklarım ve/veya atarım?

- •Bu enjeksiyon size bir sağlık kuruluşunda verilecektir. Evde saklamayacaksınız.

Genel ilaç bilgileri

- •Semptomlarınız veya sağlık sorunlarınız iyileşme göstermezse veya kötüleşirse, sağlık danışmanınızı arayın.
- •İlacınızı başkalarıyla paylaşmayın ve başka birinin ilacını kullanmayın.
- •Tüm ilaçları güvenli bir yerde tutun. Tüm ilaçları çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacağı yerde tutun.
- •Kullanılmayan veya son kullanım tarihi geçmiş ilaçları atın. Size aksi söylenmedikçe ilaçları tuvalete veya kanalizasyon sistemine dökmeyin. İlaçların en iyi şekilde nasıl atılacağına dair sorularınız varsa eczacınızla görüşün. Bölgenizde ilaç geri dönüşüm programları olabilir.
- •Bazı ilaçların başka bir hasta bilgilendirme prospektüsü bulunabilir. Bu ilaçla ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen doktorunuzla, hemşirenizle, eczacınızla veya diğer sağlık uzmanınızla görüşün.

- Aşırı doz alındığından şüpheleniyorsanız, hemen zehirlenme kontrol merkezini arayın veya tıbbi yardım alın. Neyin, ne kadar ve ne zaman alındığını söylemeye veya göstermeye hazır olun.

Tüketici Bilgilerinin Kullanımı ve Sorumluluğun Reddi: Bu genelleştirilmiş bilgiler tanı, tedavi ve/veya ilaç bilgilerinin sınırlı bir özetidir. Kapsamlı olması amaçlanmamıştır ve kullanıcının potansiyel tanı ve tedavi seçeneklerini anlamasına ve/veya değerlendirmesine yardımcı olacak bir araç olarak kullanılmalıdır. Belirli bir hasta için geçerli olabilecek durumlar, tedaviler, ilaçlar, yan etkiler veya riskler hakkındaki tüm bilgileri İÇERMEZ. Tıbbi tavsiye olarak ele alınması ya da bir sağlık personelinin bir hastanın özel ve benzersiz koşullarının muayenesine ve değerlendirmesine dayalı olarak bir sağlık personelinin tıbbi tavsiyesinin, tanısının veya tedavisinin yerini alması amaçlanmamıştır. Hastalar sağlık durumları, tıbbi soruları ve ilaç kullanımına ilişkin riskler veya faydalar dahil olmak üzere tedavi seçenekleri hakkında eksiksiz bilgi için bir sağlık personeliyle görüşmelidir. Bu bilgiler, hiçbir tedavinin veya ilacın belirli bir hasta için güvenli, etkili veya onaylı olduğunu doğrulamaz. UpToDate, Inc. ve bağlı kuruluşları, bu bilgiler veya bu bilgilerin kullanımıyla ilgili tüm garanti veya yükümlülükleri reddeder. Bu bilgilerin kullanımı, şu adresten ulaşabileceğiniz Kullanım Koşullarına tabidir: <https://www.wolterskluwer.com/en/known/clinical-effectiveness-terms>.

Last Updated 6/13/22



© 2022 UpToDate, Inc. and its affiliates and/or licensors. All rights reserved.