

Patient Education

COVID-19 Vaccine (Adenovirus Vector)

You must carefully read the "Consumer Information Use and Disclaimer" below in order to understand and correctly use this information

發音

(KO vid nine teen vak SEEN ad e noh VYE rus vek tor)

品牌名稱美國

Janssen COVID-19 Vaccine

品牌名稱加拿大

AstraZeneca COVID-19 Vaccine [DSC]; Covishield [DSC]; Janssen COVID-19 Vaccine; Vaxzevria

此藥物用於什麼目的？

- 此藥用於預防 COVID-19。

我服用此藥物「前」需告知醫師什麼？

- 若您對此藥物，此藥物的任何部分（包括polysorbate 80（聚山梨醇酯八十）），或任何其他藥物、食品或物質（包括polyethylene glycol（聚乙二醇））過敏。請務必告知您的醫師過敏情形及您出現過的癥狀。
- 如果您罹患 COVID-19、出現任何可能是 COVID-19 的症狀，或者您正在等待 COVID-19 採檢結果，或者您最近曾罹患 COVID-19。
- 若您感到不適且有發熱。
- 若您有出血問題。
- 如果您曾出現血栓和低血小板水平（血栓生成伴隨血小板減少症或 TTS）的健康問題。這包括肝素誘導的血小板減少症 (HIT)。
- 若您曾經有過稱為毛細血管滲漏症候群的健康問題。
- 如果你曾發生稱為多系統發炎症候群 (MIS) 的健康問題。
- 如果您正在服用阿斯匹靈或薄血藥。
- 如果您已接種不同的 COVID-19 疫苗。

- 如果您在過去 14 天內曾接觸 COVID-19 病患。
- 這並不是一份會與此藥物交互影響的所有藥物或健康問題之清單。
- 告知您的醫師與藥劑師有關您的所有用藥（處方藥或非處方藥、天然滋補品、維他命劑）與健康問題。務必確認在您的用藥與健康問題下服用此藥是安全的。諮詢您的醫師前，請勿開始服藥、停藥或改變用藥劑量。

在我服用此藥物時，我必須知道或做些什麼？

- 告知所有醫療照護提供者您正在服用此藥。這包括您的醫師、護理師、藥劑師和牙醫師。
- 此疫苗不會導致 COVID-19。
- 有些產品給予 1 劑量，而另一些產品則需要給予 2 劑量。有些人也許可以施打追加劑量。您需要知道您是否能返診接受注射及其時間點。若您不確定，請告知您的醫師或藥劑師。
- 目前尚不清楚接種此疫苗的人將在多長時間內免受 COVID-19 的侵害。
- 如同所有疫苗，此疫苗可能無法完全保護所有接種者。若您有任何疑問，請洽詢醫師。
- 若您在注射後有副作用，乙醯胺苯酚或非類固醇抗發炎藥（NSAID）（如布洛芬或萘普生）可能會有所幫助。
- 接種疫苗後，需按照當地公共衛生官員的指示繼續採取行動預防 COVID-19 的傳播。包括經常洗手、戴口罩、與他人保持至少 6 英尺的距離以及避免人群聚集。
- 如果您免疫力低下或正接受會使免疫力低下的藥物，請告知您的醫師。這種疫苗可能沒有作用。
- 在幹細胞移植手術或嵌合抗原受體 [CAR]-T 治療之前或期間接種過此種疫苗的人，可能需要接種另一種疫苗。若您最近曾接受或正在接受其中一種治療，請告知您的醫師。
- 研究中很少有貝爾氏麻痺的病例發生。目前尚未清楚此疫苗是否為原因。告訴醫師您是否曾經患有貝爾氏麻痺。如果您的臉部有一側肌肉無力或下垂的跡象，請立即致電醫師。
- 接受此疫苗的人很少出現過稱作格巴二氏症候群的神經系統疾病。大多數情況下，症狀在接種疫苗後 42 天內開始。50 至 64 歲的男性風險最高。若您有虛弱、刺痛、行走困難、臉部運動困難（如說話、咀嚼或吞嚥）、複視、無法移動眼睛、膀胱或是腸胃不適，請立即致電醫師。
- 此藥很少引起嚴重甚至可能致命的毛細血管滲漏症候群 (CLS)。毛細血管滲漏症候群 (CLS) 可能導致低血壓、心跳異常、胸痛或心臟病發作。也可能導致肺部或呼吸疾病、胃或腸道出血或血流量偏低、腎臟疾病、腫脹或意識惑亂。若您有任何疑問，請告知醫師。

- 若您已懷孕、計畫懷孕或進行母乳餵養，請告知醫師。您需與醫師商討使用此藥可能給您和嬰兒帶來的益處與風險。

出現哪些副作用時，需要立即致電聯絡我的醫師？

- **警告/小心：**即便極為罕見，有些人服用藥物時可能會有極為嚴重或甚至致死的副作用。若您出現下列可能與極嚴重副作用相關的任何徵兆或症狀，請立即告知您的醫師或接受醫療協助：
 - 過敏反應的症狀有皮疹；蕁麻疹；發癢；皮膚發紅、腫脹、起泡或脫皮，而且有可能伴隨發燒；喘鳴；胸口或喉嚨緊繃；難以呼吸、吞嚥或說話困難；嗓音異常嘶啞；或嘴巴、臉部、嘴唇、舌頭或喉嚨腫脹。
 - 心動過速、頭暈、昏倒、虛弱、手臂或腿部腫脹，或體重突然增加。這些可能是一種過敏反應的其他症狀或其他類型的反應。
 - 異常的燒灼、麻木或刺痛感。
 - 耳鳴。
 - 極少數情況下，接種此疫苗的人出現一種稱為特發性血小板減少性紫癩 (idiopathic thrombocytopenic purpura, ITP) 的低血小板水平。這類問題大多在接種疫苗後 42 天內發生。如果您曾經有過 ITP，請告知您的醫師。若出現任何原因不明的瘀傷或出血情況，請立即致電醫師。
 - 接種這種疫苗的人很少會出現血小板數量低（有時伴有出血）的血栓。30 歲至 49 歲之間的女性最常發生此類情況。大多數情況下，疫苗接種後 1 至 2 週內開始出現徵狀。有時候，可導致死亡。這些血栓發生在不同的部位，包括大腦、胃部和腿部。若出現任何以下症狀，請立即致電聯絡您的醫師：瘀傷或距離注射部位較遠的微小血斑、嚴重頭痛、頭痛不消失、胃痛不消失、腿部腫脹或疼痛、胸痛、呼吸短促、視力模糊、癲癇發作或感到困惑。

此藥物的一些其他副作用為何？

- 所有藥物皆可能引起副作用。但有許多人沒有副作用，或是只有輕微的副作用。假如任何一項副作用或其他任何副作用令您困擾或是不會消退，請致電您的醫師或接受醫療協助。
- 注射部位疼痛、發紅或腫脹；頭痛；肌肉或關節疼痛；發燒 100.4°F (38°C) 或以上；發冷；胃部不適、嘔吐或腹瀉；腺體腫脹或疼痛；或感到疲倦或不適。大多數副作用均中度。大多數情況下，這些副作用在注射後 1 至 2 日內消失。
- 這些並未涵蓋所有可能發生的副作用。若您對副作用有疑問，請聯絡您的醫師。請聯絡您的醫師取得關於副作用的醫療意見。

- 您可以向您的國內健康機構通報您的副作用。
- 瀏覽 <https://vaers.hhs.gov/reportevent.html> 或致電 1-800-822-7967 向 FDA/CDC 疫苗不良事件通報系統 (VAERS) 報告副作用。還有一個名為 V-Safe 的智慧型手機工具，可用於檢查您的狀況和報告副作用。可以在 <https://vsafe.cdc.gov> 找到。如果您需要 V-safe 的協助，請致電 1-800-232-4636。

此藥物的最佳服用方法為何？

- 請遵照醫師指示用藥。請詳閱所有的相關資訊。請嚴格遵照所有指示。
- 此藥用於肌肉注射。
- 使用此藥期間和用藥後一段時間，將對您密切觀察。請洽詢您的醫師。

若我錯過服藥怎麼辦？

- 請致電您的醫師詢問指示。請勿錯過或略過劑量，以達到對抗 COVID-19 的最大防護。

我應如何儲存和/或丟棄此藥物？

- 該針劑需要您前往醫療衛生機構接受注射。您不能將其存放於家中。

藥物概述

- 若您的症狀或健康問題未獲改善或變得更糟，請聯絡您的醫師。
- 勿將您的藥物分給其他人吃，也不要吃其他人的藥。
- 將所有藥物放在一個安全位置。將所有藥物放在兒童和寵物都無法觸及的地方。
- 扔掉未使用或過期的藥物。除非您被告知這樣做，否則不要將藥物沖到廁所中或倒入排水溝中。若您對於如何以最佳方式扔掉藥物有疑問，請向您的藥劑師諮詢。您所在地區可能有藥物回收計劃。
- 某些藥品可能擁有其他病患資訊說明書。若您對此藥有任何疑慮，請聯絡您的醫師、護理師、藥劑師或其他醫療保健提供者。
- 若您認為出現用藥過量的狀況，請致電您的毒物控制中心或立即接受醫療照護。請準備好告知或顯示服用藥物、服用量及發生時刻。

消費者資訊之使用與免責聲明: 此概要資訊是診斷、治療和/或藥物資訊的有限摘要。它並不全面，應用作幫助使用者瞭解和/或評估潛在的診斷和治療方法的工具。它不包括所有關於可能適用於特定病患的病情、治療、藥物、副作用或風險的資訊。它不可用作醫療建議，亦不得用於替代保健服務提供者根據保健服務提供者對病患的特定和獨特情況進行檢查和評估的醫療建議、診斷或治療。病患必須洽詢保健服務提供者，以取得有關他們的健康、醫療問題和治療方法的完整資訊，包括使用藥物的任何風險或益處。此資訊並未擔保任何治療或藥物具安全性或功效，或已獲

准用於治療特定病患。UpToDate, Inc. 及其附屬公司不承擔任何與此資訊或其使用相關之擔保或責任。此資訊的使用受使用條款所約束，此條款可在以下網址查

閱 <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>。

Last Updated 6/8/22



© 2022 UpToDate, Inc. and its affiliates and/or licensors. All rights reserved.