

Patient Education

COVID-19 Vaccine (Adenovirus Vector)

Você deve ler cuidadosamente o "Uso das informações para o consumidor e isenção de responsabilidade" abaixo para entender e usar corretamente estas informações.

Pronúncia

(KO vid nine teen vak SEEN ad e noh VYE rus vek tor)

Nomes comerciais: EUA

Janssen COVID-19 Vaccine

Nomes comerciais: Canadá

AstraZeneca COVID-19 Vaccine [DSC]; Covishield [DSC]; Janssen COVID-19 Vaccine; Vaxzevria

Para o que este medicamento é usado?

- É usado para prevenir COVID-19.

O que preciso falar para meu médico ANTES de tomar este medicamento?

- Se você for alérgico a este medicamento, algum constituinte dele (incluindo polissorbato 80) ou quaisquer outros medicamentos, alimentos ou substâncias (incluindo polietilenoglicol). Fale para seu médico sobre a alergia e os sintomas que você sentiu.
- Se você tem COVID-19, se tem algum sintoma que poderia ser de COVID-19, se está esperando para saber os resultados do teste de COVID-19 ou se teve COVID-19 recentemente.
- Se você tiver uma doença com febre.
- Se você tiver problemas de sangramento.
- Se você já teve um problema de saúde com coágulos sanguíneos e níveis baixos de plaquetas no sangue (trombose com síndrome de trombocitopenia ou TTS). Isso inclui a trombocitopenia induzida por heparina (HIT).
- Se você já teve um problema de saúde chamado Síndrome de vazamento capilar (CLS).
- Se você já teve um problema de saúde chamado síndrome inflamatória multissistêmica (MIS).
- Se estiver tomando aspirina ou um anticoagulante.
- Se você tomou uma vacina diferente de COVID-19.

- Se você teve contato com alguém com COVID-19 nos últimos 14 dias.
- Esta não é uma lista de todos os medicamentos ou todas as condições que interagem com este medicamento.
- Informe seu médico e farmacêutico sobre todos os seus medicamentos (com prescrições ou de venda sem receita, produtos naturais, vitaminas) e condições de saúde. Você deve verificar se é seguro fazer uso desse medicamento concomitantemente com os medicamentos que já usa e suas condições. Não inicie ou interrompa o uso ou altere a dosagem de qualquer medicamento sem antes consultar seu médico.

O que eu preciso saber ou fazer enquanto tomo este medicamento?

- Avise a todos os seus prestadores de cuidados que você está tomando este medicamento. Isso inclui os seus médicos, enfermeiros, farmacêuticos e dentistas.
- Esta vacina não causa COVID-19.
- Alguns produtos são administrados em 1 dose, enquanto outros precisam ser administrados em 2 doses. Algumas pessoas também podem receber dose de reforço. Procure saber se você pode voltar para receber as doses e quando fazê-lo. Se não tiver certeza, consulte o médico ou farmacêutico.
- Não se sabe por quanto tempo as pessoas que receberem esta vacina ficarão protegidas contra a COVID-19.
- Como todas as vacinas, esta vacina pode não proteger totalmente todas as pessoas que tomarem. Em caso de dúvidas, consulte o médico.
- Se você tiver efeitos colaterais após uma dose, tomar paracetamol ou anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) como ibuprofeno ou naproxeno pode ajudar.
- Depois de tomar a vacina, mantenha as medidas que previnem a disseminação de COVID-19, conforme recomendado pelas autoridades locais de saúde pública. Entre elas, lavar as mãos com frequência, usar máscara, manter-se a pelo menos 2 metros (6 pés) de distância de outras pessoas e evitar aglomerações.
- Se você tiver uma deficiência no sistema imunológico ou toma medicamentos que comprometem o sistema imunológico, consulte o médico. Esta vacina pode não ter o efeito desejado.
- As pessoas que receberam esta vacina antes ou durante um transplante de células-tronco ou terapia com receptor de antígeno quimérico (células CAR-T) podem precisar de outra vacina. Se você fez ou está fazendo um desses tratamentos, converse com seu médico.
- Raramente, ocorreram casos de paralisia de Bell nos estudos. Não se sabe se esta vacina pode ser a causa. Informe ao seu médico se você já teve paralisia de Bell. Entre em contato com seu médico imediatamente se você apresentar sinais como fraqueza muscular ou músculos caídos em um lado do rosto.

- Raramente, um problema no sistema nervoso chamado síndrome de Guillain-Barré ocorreu em pessoas que tomaram esta vacina. Na maioria dos casos, os sintomas começaram em até 42 dias após a vacina. O maior risco foi observado em homens entre 50 e 64 anos de idade. Consulte seu médico imediatamente se você tiver fraqueza, formigamento, dificuldade para andar, problemas com movimentos faciais (como falar, mastigar ou engolir), visão dupla, movimento dos olhos comprometido ou problemas com o controle da bexiga ou do intestino.
- Este medicamento, raramente, causou um problema grave, e às vezes fatal, denominado síndrome de vazamento capilar (CLS). A CLS pode causar baixa pressão arterial, batimentos cardíacos anormais, dor no peito ou taquicardia. Ela também pode causar problemas pulmonares ou respiratórios, hemorragia ou baixo fluxo sanguíneo no estômago ou intestino, problemas renais, inchaço ou confusão mental. Em caso de dúvidas, consulte o médico.
- Informe a um profissional de saúde se você estiver grávida, se pretende engravidar ou se está amamentando. Você precisará conversar sobre os benefícios e riscos para você e seu bebê.

Quais são os efeitos colaterais que preciso informar ao meu médico imediatamente?

- **ALERTA/CUIDADO:** Mesmo sendo raro, algumas pessoas podem apresentar efeitos colaterais graves e às vezes fatais quando tomam um medicamento. Avise seu médico ou obtenha auxílio médico imediatamente se você tiver algum dos sinais ou sintomas a seguir, que podem estar relacionados a um efeito colateral grave:
 - Sinais de reação alérgica, como erupções cutâneas, urticária, coceira, vermelhidão, inchaço, bolhas ou descamação da pele com ou sem febre; respiração difícil e ruidosa; aperto no peito ou na garganta; dificuldade para respirar, engolir ou falar; rouquidão incomum; ou inchaço da boca, do rosto, dos lábios, da língua ou da garganta.
 - Batimento cardíaco acelerado, tontura, desmaio, fraqueza, inchaço nos braços ou pernas ou aumento repentino de peso. Estes podem ser outros sintomas de uma reação alérgica ou outro tipo de reação.
 - Sensações anormais de queimação, dormência ou formigamento.
 - Zumbido nos ouvidos.
- Raramente, um tipo de plaquetas sanguíneas baixas chamado púrpura trombocitopênica idiopática (ITP) aconteceu em pessoas que receberam esta vacina. Na maioria das vezes, isso ocorreu em até 42 dias após a primeira dose. Se você já teve púrpura trombocitopênica idiopática, fale com seu médico. Entre em contato imediatamente com o seu médico se você apresentar hematomas ou sangramento inexplicável.
- Muito raramente, ocorreram coágulos sanguíneos com níveis baixos de plaquetas no sangue (por vezes com sangramentos) em pessoas que receberam esta vacina. Isso aconteceu com mais frequência em mulheres entre 30 e 49 anos de idade. Na maior parte do tempo, os sintomas começaram a aparecer de 1 a 2 semanas após a vacina. Às vezes, isso foi fatal. Esses coágulos sanguíneos ocorreram em locais diferentes, incluindo o cérebro, a área do estômago e as pernas. Entre em contato com o seu médico imediatamente se tiver algum destes sinais: hematomas ou pequenas manchas de sangue fora do local da injeção, dor de cabeça forte e

recorrente, dor de estômago que não passa, inchaço ou dor nas pernas, dor no peito, falta de ar, visão turva, convulsões ou sensação de confusão.

Quais são os outros efeitos colaterais deste medicamento?

- Todos os medicamentos podem causar efeitos colaterais. Entretanto, muitas pessoas não apresentam efeitos colaterais ou apenas efeitos menores. Ligue para seu médico ou obtenha auxílio médico se você sofrer com estes ou outros efeitos colaterais ou caso eles não desapareçam:
- Dor, vermelhidão ou inchaço no local da injeção; dor de cabeça; dores musculares ou articulares; febre de 38 °C (100,4 °F) ou superior; calafrios; dor de estômago, vômitos ou diarreia; glândulas inchadas ou sensíveis; ou sensação de cansaço ou indisposição. A maioria dos efeitos colaterais foi leve. Na maioria das vezes, desapareceu em 1 a 2 dias após a injeção.
- Estes não são todos os efeitos colaterais que podem ocorrer. Se tiver dúvidas sobre os efeitos colaterais, entre em contato com seu médico. Entre em contato com seu médico para receber conselhos médicos sobre os efeitos colaterais.
- Você pode informar os efeitos colaterais para sua agência nacional de saúde.
- Relate os efeitos colaterais ao Sistema de Relatório de Eventos Adversos de Vacinas (VAERS) da FDA/CDC em <https://vaers.hhs.gov/reportevent.html> ou ligando para 1-800-822-7967. Também existe uma ferramenta para smartphone chamada V-safe, que pode ser usada para verificar seu estado e para relatar efeitos colaterais. A ferramenta pode ser encontrada em <https://vsafe.cdc.gov>. Se precisar de ajuda com o V-safe, ligue para 1-800-232-4636.

Como este medicamento é melhor administrado?

- Utilize este medicamento conforme as recomendações médicas. Leia todas as informações fornecidas. Siga rigorosamente todas as instruções.
- Este medicamento é dado como uma injeção em um músculo.
- Você será observado de perto enquanto receber este medicamento e por algum tempo após sua dose. Consulte seu médico.

O que devo fazer se eu deixar de tomar uma dose?

- Entre em contato com seu médico para obter instruções. Para maior proteção contra a COVID-19, é importante que você não esqueça ou pule doses.

Como devo armazenar e/ou eliminar este medicamento?

- Esta injeção será aplicada em você em instalações médicas. Você não a manterá em casa.

Informações gerais sobre o medicamento

- Se os sintomas ou suas condições médicas não melhorarem ou piorarem, entre em contato com seu médico.

- Não compartilhe seus medicamentos com outras pessoas e não tome os medicamentos de nenhuma outra pessoa.
- Mantenha todos os medicamentos em um local seguro. Mantenha todos os medicamentos fora do alcance de crianças e animais.
- Jogue fora medicamentos não utilizados ou vencidos. Não jogue no vaso sanitário e dê descarga nem despeje no esgoto, a menos que tenha sido orientado a fazer isso. Converse com seu farmacêutico se tiver perguntas sobre a melhor forma de descartar medicamentos. Podem existir programas de coleta de medicamentos na sua área.
- Alguns medicamentos podem ter outra bula de informações ao paciente. Se tiver dúvidas sobre este medicamento, fale com um médico, enfermeiro, farmacêutico ou outro profissional da área.
- Se você acha que ocorreu uma overdose, ligue para seu centro de controle de intoxicações ou procure tratamento médico imediatamente. Esteja preparado para contar ou mostrar qual medicamento foi tomado, a quantidade e quando aconteceu.

Informações de uso para o consumidor e isenção de responsabilidade: Estas informações gerais são um resumo limitado de diagnóstico, tratamento e/ou informações sobre a medicação. Não há o objetivo de que sejam abrangentes e devem ser usadas como uma ferramenta para ajudar o consumidor a entender e/ou avaliar possíveis opções de diagnóstico e tratamento. NÃO incluem todas as informações sobre condições, tratamentos, medicamentos, efeitos colaterais ou riscos que possam se aplicar a um paciente específico. Não se destina a ser uma orientação médica ou um substituto para uma orientação médica, diagnóstico ou tratamento de um prestador de serviços de saúde com base no exame e avaliação do prestador de serviços de saúde das circunstâncias específicas e únicas de um paciente. Os pacientes devem falar com um prestador de serviços de saúde para obter informações completas sobre sua saúde, questões médicas e opções de tratamento, incluindo quaisquer riscos ou benefícios relativos ao uso de medicamentos. Estas informações não endossam qualquer tratamento ou medicamento como seguro, eficiente ou aprovado para o tratamento de um paciente específico. A UpToDate, Inc. e suas afiliadas renunciam a qualquer garantia ou responsabilidade relacionada a estas informações ou ao uso destas. O uso destas informações é regido pelos Termos de Uso, disponível em <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Last Updated 6/8/22



© 2022 UpToDate, Inc. and its affiliates and/or licensors. All rights reserved.