

Patient Education

COVID-19 檢測

You must carefully read the "Consumer Information Use and Disclaimer" below in order to understand and correctly use this information

為何執行此程序（或做此手術）？

2019 年冠狀病毒疾病也稱為 COVID-19，係由一種稱為 SARS 相關冠狀病毒 (SARS-CoV-2) 的病毒引起。醫師可能會要求對您進行檢驗，看您目前是否感染了 COVID-19。他們還可能藉由檢驗來瞭解您過去是否感染過 COVID-19。

您有必要瞭解自己接受的是何種檢驗。醫師藉由病毒檢驗來確定您是否患有 COVID-19。大多數情況下，會使用鼻腔或喉嚨拭子。血液檢驗（驗血）是另一種 COVID-19 檢驗方法，可以檢查您的身體是否已對病毒產生了抗體。如果您產生了抗體，意味着您過去曾經感染過這種病毒或已接種疫苗。

會是什麼結果？

病毒檢驗（使用鼻子或喉嚨拭子）：

- 醫師將查看您的檢驗結果。醫師可能得知您有疾病的跡象。這種疾病很容易傳播給其他人，或者您患病的風險更大。
- 如果檢驗結果呈陽性，則表示您屬於開放性感染。您可能或不可能出現這種疾病的症狀。
- 如果檢驗結果呈陰性，您很可能在檢驗時沒有感染。可能在感染時過早採集樣本。您的症狀可能是來自其他類型的疾病。這並不表示您未感染 COVID-19。如果您持續出現 COVID-19 的跡象，醫師可能要求進行其他檢驗。

血液檢驗（抗體檢驗）：

- 醫師將查看您的檢驗結果。
- 如果檢驗結果呈陽性，則表示您在某時間有被 COVID-19 感染或已接受疫苗。您可能對這種疾病免疫，但是醫師不知道您是否可以避免再次生病或持續多長時間。

- 如果檢驗結果呈陰性，則表示著您的體內身體沒有產生 COVID-19 抗體。大多數情況下，表示您沒有受到感染。這也表示您最近感染，但體內尚未產生抗體。
- 該項檢驗有助於公共衛生官員追蹤疾病。判斷您是否屬於活動性感染並沒有太大幫助。

手術前會發生什麼？

- 在檢測之前，無需做特別的事。
- 告知醫師下列事項：
 - 您正使用的所有藥物
 - 您是否有任何出血問題

手術期間會發生什麼？

進行此檢測只需幾分鐘。整個檢測期間，您將保持清醒狀態。

- **病毒檢驗：**工作人員會將一個拭子插入您的鼻子並輕輕轉動。有時候工作人員會擦拭鼻子或喉嚨的兩側。工作人員可能要求您自行操作。這可能令人感到不舒服，但只會持續幾秒鐘。
- **血液檢驗：**使用針頭從您身上抽取少量血。您可能感到有點痛。工作人員將拔出針頭，並在您的皮膚上纏上繃帶。有時候工作人員會刺您的手指，收集少量血液進行檢驗。

手術後會發生什麼？

- 在站立之前，您可能想靜坐幾分鐘。這將幫助預防您在檢驗後感覺暈眩。
- 如果您進行了血液檢驗（驗血），請用另一隻手在針頭處施壓。這可緩解瘀傷和出血。
- 詢問醫師您何時會得到檢驗結果。

家中需要哪些照護？

如果您認為自己感染了 COVID-19 或已經接觸過感染 COVID-19 的人，請與他人保持距離至少 14 天。

需要哪些後續照護？

醫師可能會要求您前來就診，以確認您的進展。請務必前往就診。

可能有出現哪些問題的風險？

- 疼痛
- 青腫
- 出血
- 感覺暈眩

消費者資訊使用與免責聲明:

此資訊並不代表具體的醫療建議，您必須遵從專業醫護人員為您提供的具體醫療指示與建議。這裡僅提供一般概要資訊。這裡的資訊不一定包含適用於您的所有資訊，關於身體狀況、疾病、傷害、測試、手術、治療、療法、出院醫囑或生活習慣（方式）改變諸方面的資訊不一定全部對您適合。您必須洽詢您的專業醫護人員，瞭解關於您健康狀況和治療方法選擇的完整資訊。您不應因這裡的資訊而決定是否要接受專業醫護人員的建議、指示或推薦療法。您應謹遵專業醫護人員（醫師/護理士）的建議與指示，因為她們才最瞭解您的狀況並接受過專業訓練，可為您提供最恰當的建議和指引。 <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>

Last Updated 4/13/22



© 2022 UpToDate, Inc. and its affiliates and/or licensors. All rights reserved.