

# Patient Education

---

## **COVID-19 Vaccine (Adenovirus Vector)**

Vous devez lire attentivement la rubrique « Renseignements destinés aux consommateurs et exclusion de responsabilité » ci-dessous afin de comprendre et d'utiliser correctement ces informations.

### **Prononciation**

(KO vid nine teen vak SEEN ad e noh VYE rus vek tor)

### **Noms des marques: É.-U.**

Janssen COVID-19 Vaccine

### **Noms des marques: Canada**

AstraZeneca COVID-19 Vaccine [DSC]; Covishield [DSC]; Janssen COVID-19 Vaccine; Vaxzevria

### **Pour quelles raisons ce médicament est-il prescrit?**

- Ce médicament est prescrit pour prévenir la COVID-19.

### **AVANT de prendre ce médicament, que dois-je dire au médecin?**

- Si vous êtes allergique à ce médicament; à l'un des composants de ce médicament (notamment le polysorbate 80) ou à tout autre médicament, aliment ou substance (notamment le polyéthylène glycol). Informez votre médecin de votre réaction allergique ou des signes qui se sont manifestés.
- Si vous avez la COVID-19, si vous présentez des symptômes pouvant être ceux de la COVID-19, si vous attendez de connaître les résultats du test de dépistage de la COVID-19 ou si vous avez récemment eu la COVID-19.
- Si vous souffrez d'une maladie accompagnée de fièvre.
- Si vous souffrez de saignements.
- Si vous avez déjà eu un état de santé lié à des caillots sanguins et un faible taux de plaquettes sanguines (thrombose avec syndrome de thrombocytopenie ou TTS). Cela inclut la thrombocytopenie induite par l'héparine (TIH).
- Si vous avez déjà eu un problème de santé appelé syndrome de fuite capillaire.
- Si vous avez déjà eu un problème de santé appelé syndrome inflammatoire multisystémique (MIS, Multisystem Inflammatory Syndrome).

- Si vous prenez de l'aspirine ou un anticoagulant.
- Si vous avez reçu un vaccin COVID-19 différent.
- Si vous avez été en contact avec une personne atteinte de la COVID-19 au cours des 14 derniers jours.
- Il ne s'agit pas d'une liste de tous les médicaments et problèmes de santé qui interagissent avec ce médicament.
- Informez votre médecin et votre pharmacien des médicaments que vous prenez (sur ordonnance ou en vente libre, produits naturels ou vitamines) et de vos problèmes de santé. Vous devez vous assurer que vous pouvez prendre ce médicament en toute sécurité en tenant compte de tous vos médicaments et de vos problèmes de santé. Ne commencez pas à prendre un médicament, à cesser de le prendre ou à en modifier la dose sans avoir vérifié au préalable avec votre médecin.

### **Que dois-je savoir ou faire pendant que je prends ce médicament?**

- Informez tous vos fournisseurs de soins de santé que vous prenez ce médicament. Cela inclut vos médecins, infirmiers, pharmaciens et dentistes.
- Ce vaccin ne peut pas entraîner la COVID-19.
- Certains produits sont administrés en une dose, tandis que d'autres doivent être administrés en deux doses. Certaines personnes peuvent également recevoir une dose de rappel. Assurez-vous de savoir si vous pouvez revenir recevoir les doses et à quelle date. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.
- On ne sait pas combien de temps les personnes qui reçoivent ce vaccin seront protégées contre la COVID-19.
- Comme tous les vaccins, celui-ci est susceptible de ne pas protéger complètement toutes les personnes qui le reçoivent. Si vous avez des questions, adressez-vous au médecin.
- Si vous ressentez des effets secondaires après une dose, l'acétaminophène ou les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) comme l'ibuprofène ou le naproxène peuvent vous aider.
- Après avoir reçu le vaccin, continuez à appliquer les mesures qui empêchent la propagation de la COVID-19 qui sont recommandées par les responsables locaux de la santé publique. Il s'agit notamment de se laver souvent les mains, de porter un masque, de rester à au moins 1,80 mètre (6 pieds) des autres personnes et d'éviter les foules.
- En cas d'affaiblissement de votre système immunitaire ou si vous prenez des médicaments qui l'affaiblissent, consultez votre médecin. Ce vaccin est susceptible de ne pas fonctionner aussi bien.
- Les personnes qui ont reçu ce vaccin avant ou pendant une greffe de cellules souches ou une thérapie par lymphocytes T à récepteur antigénique chimérique (CAR-T) devront peut-être recevoir un autre vaccin. Si vous avez suivi, ou suivez, un de ces traitements, consultez votre médecin.

- Rarement, des cas de paralysie de Bell se sont produits dans les études. On ne sait pas si ce vaccin peut en être la cause. Informez votre médecin si vous avez déjà eu la paralysie de Bell. Appelez immédiatement votre médecin si vous présentez des signes tels que des muscles faibles ou tombants d'un côté de votre visage.
- Un problème du système nerveux, appelé syndrome de Guillain-Barré, est survenu dans de très rares cas chez les personnes qui ont reçu ce vaccin. La plupart du temps, les symptômes ont commencé dans les 42 jours suivant le vaccin. Il a été observé que les hommes âgés de 50 à 64 ans étaient les plus à risque. Appelez votre médecin immédiatement si vous ressentez une faiblesse, des fourmillements, des difficultés à marcher, des problèmes moteurs au visage (pour parler, mâcher ou avaler), une vision double, une incapacité à bouger les yeux ou des problèmes de contrôle de la vessie ou de l'intestin.
- Dans de rares cas, ce médicament a occasionné un problème grave, voire parfois mortel, appelé syndrome de fuite capillaire (SFC). Le SFC peut entraîner une hypotension artérielle, un rythme cardiaque anormal, des douleurs dans la poitrine ou une crise cardiaque. Il peut également causer des troubles pulmonaires ou respiratoires, des saignements ou une diminution du flux sanguin dans l'estomac ou l'intestin, des troubles rénaux, une enflure ou un sentiment de confusion. Si vous avez des questions, adressez-vous au médecin.
- Si vous êtes enceinte, prévoyez de le devenir ou allaitez, informez-en votre médecin. Vous devrez discuter des avantages et des risques pour vous et le bébé.

#### À l'apparition de quels effets secondaires dois-je appeler immédiatement le médecin?

- **AVERTISSEMENT/ATTENTION** : Même si cela arrive rarement, certaines personnes peuvent avoir des effets secondaires très graves, voire mortels, lors de la prise d'un médicament. Si vous présentez les signes ou les symptômes suivants qui risquent d'être liés à un effet secondaire grave, consultez votre médecin immédiatement ou demandez de l'aide médicale :
- Signes de réaction allergique : éruption cutanée, urticaire, démangeaisons, rougeur, enflure ou cloques ou desquamations de la peau avec ou sans fièvre, respiration sifflante, sensation d'oppression dans la poitrine ou la gorge, difficultés à respirer, à avaler ou à parler, enrouement inhabituel ou enflure de la bouche, du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge.
- Palpitations, vertige, évanouissement, faiblesse, enflure des bras ou des jambes ou prise de poids soudaine. Ces effets peuvent être d'autres signes d'une réaction allergique ou d'un autre type de réaction.
- Sensations inhabituelles de brûlures ou fourmillements qui ne sont pas normales.
- Tintements dans les oreilles.
- Rarement, un type de faible taux de plaquettes sanguines appelé purpura thrombopénique idiopathique (PTI) s'est produit chez les personnes qui ont reçu ce vaccin. La plupart du temps, cela s'est produit dans les 42 jours suivant le vaccin. Si vous avez déjà eu un PTI, parlez-en à votre médecin. Si vous présentez des ecchymoses ou des saignements inexplicables, appelez immédiatement votre médecin.

- Dans de rares cas, des caillots sanguins avec de faibles taux de plaquettes sanguines (parfois avec des saignements) sont survenus chez des personnes qui ont reçu ce vaccin. Cela s'est produit le plus souvent chez les femmes âgées de 30 à 49 ans. La plupart du temps, les signes ont commencé dans les 1 à 2 semaines après le vaccin. Certains cas se sont avérés mortels. Ces caillots sanguins se sont formés à différents endroits, y compris le cerveau, l'estomac et les jambes. Si vous présentez l'un de ces symptômes, appelez immédiatement votre médecin : ecchymoses ou petites taches de sang loin de la zone d'injection, maux de tête intenses, maux de tête persistants, douleurs persistantes à l'estomac, douleurs ou enflure au niveau des jambes, douleurs dans la poitrine, essoufflement, vision trouble, convulsions ou sensation de confusion.

### **Quels sont les effets secondaires les plus courants de ce médicament?**

- Tous les médicaments sont susceptibles de provoquer des effets secondaires. Toutefois, un grand nombre de personnes n'en ressentent aucun ou ne ressentent que des effets secondaires légers. Si l'un de ces effets secondaires ou d'autres effets secondaires se manifestent ou ne disparaissent pas, appelez votre médecin ou demandez de l'aide médicale :
- Douleurs, rougeur ou enflure au niveau du site d'injection; maux de tête; douleurs musculaires ou articulaires; fièvre de 38 °C (100,4 °F) ou plus; frissons; nausées, vomissements ou diarrhée; glandes enflées ou sensibles; sensation de fatigue ou de malaise. La plupart des effets secondaires ont été légers. La plupart du temps, ils ont disparu au bout d'un à deux jours après l'injection.
- Ce ne sont pas tous les effets secondaires qui peuvent survenir. Pour toute question sur les effets secondaires, appelez votre médecin. Pour tout avis médical sur les effets secondaires, appelez votre médecin.
- Vous pouvez signaler les effets secondaires à un organisme de santé national.
- Signalez les effets secondaires au système de signalement d'événements indésirables liés aux vaccins de la FDA/des CDC (VAERS) à l'adresse <https://vaers.hhs.gov/reportevent.html> ou en appelant le 1-800-822-7967. Il existe également un outil pour smartphone appelé V-safe qui peut être utilisé pour vérifier comment vous allez et pour signaler les effets secondaires. Il est disponible sur le site <https://vsafe.cdc.gov>. Si vous avez besoin d'aide avec V-safe, appelez le 1-800-232-4636.

### **Quelle est la meilleure voie d'administration de ce médicament?**

- Prenez ce médicament selon les recommandations de votre médecin. Lisez tous les renseignements qui vous sont fournis. Suivez scrupuleusement toutes les instructions reçues.
- Ce médicament est injecté dans un muscle.
- Vous ferez l'objet d'une surveillance étroite pendant l'administration de ce médicament et durant un certain temps après l'avoir reçu. Consultez votre médecin.

### **Que dois-je faire si j'oublie une dose?**

- Appelez votre médecin pour obtenir des instructions. Afin de vous protéger de façon optimale contre la COVID-19, il est important de ne pas oublier ou sauter les doses.

### **Comment dois-je conserver et/ou jeter ce médicament?**

- Cette injection vous sera administrée dans un établissement de soins de santé. Vous ne la conserverez pas à la maison.

### **Renseignements généraux sur les médicaments**

- Si vos symptômes ou vos problèmes de santé ne s'améliorent pas ou s'aggravent, appelez votre médecin.
- Ne donnez pas ce médicament à quelqu'un d'autre et ne prenez pas le médicament de quelqu'un d'autre
- Conservez tous les médicaments dans un endroit sûr. Tous les médicaments doivent être tenus hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.
- Jetez les médicaments périmés ou inutilisés. Ne les jetez pas dans la toilette ni dans l'évier à moins d'indication contraire. Pour toute question concernant la meilleure façon d'éliminer ces médicaments, consultez votre pharmacien. Des programmes de récupération de médicaments existent peut-être dans votre région.
- Certains médicaments peuvent être décrits sur un autre feuillet d'information au patient. Si vous avez des questions concernant ce médicament, veuillez consulter votre médecin, votre infirmier, votre pharmacien ou un autre fournisseur de soins de santé.
- Si vous pensez qu'il y a eu un surdosage, appelez immédiatement votre centre antipoison ou obtenez des soins médicaux. Préparez-vous à montrer le médicament absorbé et à préciser la quantité et le moment où cela s'est produit.

Utilisation des informations et avertissement à l'attention des consommateurs: Ces renseignements généraux constituent un bref résumé des informations sur le diagnostic, le traitement et/ou les médicaments. Il ne se veut pas exhaustif et doit être utilisé comme un outil pour aider l'utilisateur à comprendre et/ou évaluer les options potentielles de diagnostic et de traitement. Il ne contient PAS toutes les informations sur les conditions, les traitements, les médicaments, les effets secondaires ou les risques qui peuvent s'appliquer à un patient spécifique. Il n'est pas destiné à servir d'avis médical ou de substitut à l'avis médical, au diagnostic ou au traitement d'un fournisseur de soins de santé basé sur l'examen et l'évaluation par le fournisseur de soins de santé des conditions spécifiques et uniques d'un patient. Les patients doivent s'adresser à un fournisseur de soins de santé pour obtenir des informations complètes sur leur santé, des questions médicales et des options de traitement, notamment les risques ou les avantages liés à l'utilisation de médicaments. La présente information ne donne aucune garantie sur l'innocuité, l'efficacité de ces traitements et médicaments ou sur leur adéquation pour traiter un patient spécifique. UpToDate, Inc. et ses filiales déclinent toute garantie ou responsabilité concernant ces informations ou leur utilisation. L'utilisation de ces informations est régie par les conditions générales, disponibles sur le site <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Last Updated 6/8/22



© 2022 UpToDate, Inc. and its affiliates and/or licensors. All rights reserved.