

Patient Education

COVID-19 Vaccine (mRNA)

Você deve ler cuidadosamente o "Uso das informações para o consumidor e isenção de responsabilidade" abaixo para entender e usar corretamente estas informações.

Pronúncia

(KO vid nine teen vak SEEN m R N A)

Nomes comerciais: EUA

Comirnaty; Moderna COVID-19 Vac (Booster); Moderna COVID-19 Vaccine; Pfizer COVID-19 Vac-TriS 5-11y; Pfizer-BioNT COVID-19 Vac-TriS; Pfizer-BioNTech COVID-19 Vacc; Spikevax COVID-19 Vaccine

Nomes comerciais: Canadá

Comirnaty; Spikevax

Para o que este medicamento é usado?

- É usado para prevenir COVID-19.

O que preciso falar para o médico ANTES de meu filho tomar este medicamento?

- Se seu(ua) filho(a) for alérgico a este medicamento, algum constituinte dele ou quaisquer outros medicamentos, alimentos ou substâncias (incluindo polissorbato). Fale para o médico sobre a alergia e os sintomas que seu(ua) filho(a) sentiu.
- Se seu(ua) filho(a) tem COVID-19, tem algum sintoma que poderia ser de COVID-19, está esperando para saber os resultados do teste de COVID-19 ou teve COVID-19 recentemente.
- Se o seu filho tiver uma doença com febre.
- Se seu(ua) filho(a) já teve determinados problemas cardíacos (miocardite, pericardite).
- Se a criança já teve um problema de saúde chamado síndrome inflamatória multissistêmica (MIS).
- Se seu filho desenvolver problemas de sangramento.
- Se seu(ua) filho(a) estiver tomando aspirina ou um anticoagulante.
- Se o seu(ua) filho(a) recebeu uma vacina diferente de COVID-19.
- Se seu(ua) filho(a) teve contato com alguém com COVID-19 nos últimos 14 dias.

- Esta não é uma lista de todos os medicamentos ou todas as condições que interagem com este medicamento.
- Informe ao médico e farmacêutico todos os medicamentos (com prescrição ou de venda livre, produtos naturais, vitaminas) e problemas de saúde do seu filho. Você deve verificar se é seguro fazer uso deste medicamento concomitantemente com os medicamentos que o seu filho já usa e suas condições. Não inicie ou interrompa o uso ou altere a dosagem de qualquer medicamento que seu filho toma sem antes consultar o médico.

O que eu preciso saber ou fazer enquanto meu filho toma este medicamento?

- •Avisar a todos os profissionais de saúde do seu filho que ele está tomando este medicamento. Isso inclui os médicos, enfermeiros, farmacêuticos e dentistas do seu filho.
- •Esta vacina não causa COVID-19.
- •Seu(u) filho(a) precisará tomar 2 doses desta vacina. É necessário tomar as duas doses para obter a máxima proteção. Algumas pessoas também podem precisar de uma terceira dose. Uma dose de reforço também pode ser administrada a algumas pessoas. Procure saber quando seu(u) filho(a) terá de voltar para receber a segunda dose. Se seu(u) filho(a) teve uma reação grave após a primeira dose, consulte o médico.
- •Não se sabe por quanto tempo as pessoas que receberem esta vacina ficarão protegidas contra a COVID-19.
- •Como todas as vacinas, esta vacina pode não proteger totalmente todas as pessoas que tomarem. Em caso de dúvidas, consulte o médico.
- •Se seu(u) filho(a) tiver efeitos colaterais após uma dose, tomar paracetamol ou anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) como ibuprofeno ou naproxeno pode ajudar.
- •Os efeitos colaterais podem ocorrer com mais frequência após a segunda dose. Em caso de dúvidas sobre a segunda dose, consulte o médico.
- •Depois de tomar a vacina, faça com que seu(u) filho(a) mantenha as medidas que previnem a disseminação de COVID-19, conforme recomendado pelas autoridades locais de saúde pública. Entre elas, lavar as mãos com frequência, usar máscara, manter-se a pelo menos 2 metros (6 pés) de distância de outras pessoas e evitar aglomerações.
- •Se seu filho tem uma deficiência no sistema imunológico ou toma medicamentos que comprometem o sistema imunológico, consulte o médico. Esta vacina pode não ter o efeito desejado.
- •As pessoas que receberam esta vacina antes ou durante um transplante de células-tronco ou terapia com receptor de antígeno quimérico (células CAR-T) podem precisar de outra vacina. Se seu(u) filho(a) fez ou está fazendo um desses tratamentos, converse com o médico.
- •Se seu(u) filho(a) recebeu injeção de preenchimento dérmico, consulte o médico. Raramente ocorreu inchaço na área do preenchimento ou próximo a ela (geralmente no rosto ou nos

lábios) após uma dose desta vacina. Quando isso aconteceu, não durou muito e passou com o tratamento.

- Raramente, ocorreram casos de paralisia de Bell nos estudos. Não se sabe se esta vacina pode ser a causa. Informe ao seu médico se seu(ua) filho(a) já teve paralisia de Bell. Entre em contato com seu médico imediatamente se seu(ua) filho(a) apresentar sinais como fraqueza muscular ou músculos caídos em um lado do rosto.
- Nem todos os produtos são destinados para uso em crianças. Consulte o profissional de saúde.
- **Se a sua filha estiver gestante ou amamentando:**
- Converse com o médico se a sua filha estiver grávida, engravidar ou estiver amamentando. Você precisará conversar sobre os benefícios e riscos para sua filha e o bebê.

Quais são os efeitos colaterais que preciso informar ao médico do meu filho imediatamente?

- **ALERTA/CUIDADO:** mesmo sendo raro, algumas pessoas podem apresentar efeitos colaterais graves e, às vezes, fatais quando tomam um medicamento. Entre em contato com o médico do seu filho ou obtenha assistência médica imediatamente se o seu filho apresentar algum dos sinais ou sintomas a seguir, que podem estar relacionados a um efeito colateral grave:
- Sinais de reação alérgica, como erupções cutâneas, urticária, coceira, vermelhidão, inchaço, bolhas ou descamação da pele com ou sem febre; respiração difícil e ruidosa; aperto no peito ou na garganta; dificuldade para respirar, engolir ou falar; rouquidão incomum; ou inchaço da boca, do rosto, dos lábios, da língua ou da garganta.
- Batimento cardíaco rápido ou lento, respiração acelerada, tontura, desmaio, fraqueza, ansiedade, confusão ou alteração na visão ou audição. Estes podem ser outros sintomas de uma reação alérgica ou outro tipo de reação.
- Sentido do tato ou sensação reduzida.
- Torpor ou formigamento.
- Alguns problemas cardíacos ocorreram muito raramente com as vacinas de RNA para a covid-19. Na maioria das vezes, os sinais começaram 7 dias após a segunda dose. Esses problemas cardíacos podem acontecer com maior frequência em pessoas que contraírem a COVID-19 do que em pessoas que receberem esta vacina. Chame o médico imediatamente se seu(ua) filho(a) tiver dor no tórax, falta de ar ou se ele(a) sentir que seu coração está batendo de forma acelerada, agitada ou está palpitando. Se você tiver dúvidas ou preocupações sobre essas informações, converse com o médico.

Quais são os outros efeitos colaterais deste medicamento?

- Todos os medicamentos podem causar efeitos colaterais. Entretanto, muitas pessoas não apresentam efeitos colaterais ou apenas efeitos menores. Entre em contato com o médico do seu filho ou obtenha auxílio médico se o seu filho sofrer com estes ou outros efeitos colaterais ou caso eles não desapareçam:

- Dor, vermelhidão ou inchaço no local da injeção; dor de cabeça; dores musculares ou articulares; febre de 38 °C (100,4 °F) ou superior; calafrios; náusea, vômitos, falta de apetite ou diarreia; glândulas inchadas ou sensíveis; ou sensação de cansaço ou indisposição. A maioria dos efeitos colaterais foi leve a moderada. Na maioria das vezes, isso aconteceu até 3 dias após a injeção e desapareceu em 1 a 3 dias.
- Dor, vermelhidão ou inchaço no local da injeção ocorreram alguns dias ou algumas semanas após a primeira injeção. Se isso acontecer, converse com o médico. Faça com que seu(u) filho(a) tome a segunda dose no outro braço.
- Estes não são todos os efeitos colaterais que podem ocorrer. Se você tem dúvidas sobre os efeitos colaterais, entre em contato com o médico do seu filho. Entre em contato com o médico do seu filho para receber recomendações sobre os efeitos colaterais.
- Você pode informar os efeitos colaterais para sua agência nacional de saúde.

Como este medicamento é melhor administrado?

- Utilize este medicamento conforme as recomendações do médico do seu filho. Leia todas as informações fornecidas. Siga rigorosamente todas as instruções.
- Este medicamento é dado como uma injeção em um músculo.
- Seu(u) filho(a) será observado(a) de perto enquanto recebe esse medicamento e por algum tempo após a dose. Converse com o médico de seu(u) filho(a).

O que devo fazer se meu filho esquecer de tomar uma dose do medicamento?

- Converse com o seu médico para saber como fazer isso. Para maior proteção contra a COVID-19, é importante que seu(u) filho(a) não esqueça ou pule nenhuma dose.

Como devo armazenar e/ou eliminar este medicamento?

- A injeção será administrada em seu filho num estabelecimento de saúde. Você não a armazenará em casa.

Informações gerais sobre o medicamento

- Se os sintomas ou condições do seu filho não melhorarem ou piorarem, entre em contato com o seu médico.
- Não compartilhe o medicamento da sua criança com outras pessoas e não dê o medicamento de nenhuma outra pessoa à sua criança.
- Mantenha todos os medicamentos em um local seguro. Mantenha todos os medicamentos fora do alcance de crianças e animais.
- Jogue fora medicamentos não utilizados ou vencidos. Não jogue no vaso sanitário e dê descarga nem despeje no esgoto, a menos que tenha sido orientado a fazer isso. Converse com seu farmacêutico se tiver perguntas sobre a melhor forma de descartar medicamentos. Podem existir programas de coleta de medicamentos na sua área.

- Alguns medicamentos podem ter outra bula de informações ao paciente. Se tiver dúvidas sobre este medicamento, fale com o médico do seu filho, um enfermeiro, farmacêutico ou outro profissional de saúde.
- Se você acha que ocorreu uma overdose, ligue para seu centro de controle de intoxicações ou procure tratamento médico imediatamente. Esteja preparado para contar ou mostrar qual medicamento foi tomado, a quantidade e quando aconteceu.

Informações de uso para o consumidor e isenção de responsabilidade: Estas informações gerais são um resumo limitado de diagnóstico, tratamento e/ou informações sobre a medicação. Não há o objetivo de que sejam abrangentes e devem ser usadas como uma ferramenta para ajudar o consumidor a entender e/ou avaliar possíveis opções de diagnóstico e tratamento. NÃO incluem todas as informações sobre condições, tratamentos, medicamentos, efeitos colaterais ou riscos que possam se aplicar a um paciente específico. Não se destina a ser uma orientação médica ou um substituto para uma orientação médica, diagnóstico ou tratamento de um prestador de serviços de saúde com base no exame e avaliação do prestador de serviços de saúde das circunstâncias específicas e únicas de um paciente. Os pacientes devem falar com um prestador de serviços de saúde para obter informações completas sobre sua saúde, questões médicas e opções de tratamento, incluindo quaisquer riscos ou benefícios relativos ao uso de medicamentos. Estas informações não endossam qualquer tratamento ou medicamento como seguro, eficiente ou aprovado para o tratamento de um paciente específico. A UpToDate, Inc. e suas afiliadas renunciam a qualquer garantia ou responsabilidade relacionada a estas informações ou ao uso destas. O uso destas informações é regido pelos Termos de Uso, disponível em <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Last Updated 6/8/22



© 2022 UpToDate, Inc. and its affiliates and/or licensors. All rights reserved.